

SABÍA  
QUE...

## Sobre su enfermedad

La **bronquiectasia** es una enfermedad respiratoria crónica, de causa diversa, caracterizada por un cuadro de tos, producción de esputo e infección bronquial recurrente. Es habitual que el moco se acumule en las vías respiratorias y esto provoque sobreinfecciones, que a su vez induzcan más inflamación, entrando en una especie de círculo vicioso.

La infección debida a la bacteria **Pseudomonas aeruginosa** está presente aproximadamente en la cuarta parte de los pacientes con bronquiectasias, y se asocia a una función pulmonar peor y una frecuencia mayor de hospitalización.

La bronquiectasia no tiene cura, aún no hay nada que revierta el daño inicial, pero con un tratamiento adecuado pueden mejorar muchos los síntomas y ralentizar la progresión. Está dirigido a eliminar la mucosidad, prevenir infecciones y reducir la inflamación. Y es muy importante hacerlo correctamente y no abandonar (a no ser que así se lo indiquen) cuando se sienta mejor.

## Sobre su medicación

**Quinsair** contiene un medicamento antibiótico denominado **levofloxacino**. Pertenece al grupo de antibióticos llamados fluoroquinolonas y se usa para tratar infecciones de pulmón causadas por **Pseudomonas aeruginosa**

### Datos de administración

La dosis recomendada es de 240 mg (**una ampolla**) administrados por inhalación **dos veces al día durante 28 días** alternando con periodos de descanso de otros 28 días. Su médico le indicara la duración del tratamiento; **no suspenda el tratamiento antes**.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístresela los antes posible, pero si ya han pasado más de 6 horas espere a la siguiente dosis. **NO TOME UNA DOSIS DOBLE PARA COMPENSAR UN OLVIDO**

Es posible que además de su inhalador le hayan prescrito antibiótico orales, bien como preventivos o como parte de la terapia

Estos antibióticos orales es frecuente que presenten interacciones con otros medicamentos. Consulte a su farmacéutico o médico ante cualquier tratamiento nuevo que le prescriban, incluidas plantas medicinales

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.

## ¿Cómo administrarlo?

Si las vías superiores están congestionadas, se aconseja comenzar con una limpieza nasal. Son envases unidos. que se deben vaciar en el receptáculo del nebulizador. Deseche cualquier cantidad que pueda sobrarle. En cualquier caso atégase a las instrucciones de la ficha técnica en cuanto al manejo del nebulizador

Si tiene más medicación inhalada debe ponérsela siguiendo el siguiente orden:

1. Broncodilatadores (p.ej. salbutamol)
2. Fisioterapia respiratoria.
3. Otros medicamentos para inhalar, si es el caso.
4. Por último, Levofloxacino nebulización.

**!! Es muy importante que siga ese orden !!**

**Debe enjuagarse la boca y lavarse la cara después de cada nebulización para evitar la posible aparición de hongos**

## Contraindicaciones y precauciones

Si es **alérgico a levofloxacino**, o a cualquier otro del grupo: moxifloxacino, ciprofloxacino u ofloxacino; o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

Si ha tenido alguna vez **problemas con sus tendones** (inflamación o rotura de un tendón) durante el tratamiento con un antibiótico quinolónico o fluoroquinolónico

Si padece de **epilepsia**

Si está **embarazada** o en periodo de lactancia

## Efectos adversos

- Los efectos adversos más frecuentes, que no tienen porqué darse con todo el mundo, son:
  - Tos.
  - Sentido del gusto anormal
  - Cansancio, debilidad, pérdida de apetito y pérdida de peso
- Raramente puede aparecer:
  - dolor en el pecho y respiración entrecortada, erupciones cutáneas o bucales, tos con sangre, dolor de cabeza o mareos, pitidos en los oídos o náuseas o vómitos. Contacte con su médico ante cualquier efecto adverso grave.

## Toma de Quinsair con otros medicamentos

- Informe a su médico o farmacéutico de la medicación que toma habitualmente. Este fármaco puede interferir con otros como warfarina, teofilina, AINES, cimetidina o ciclosporina.

Cada ampolla es solamente para un solo uso. Una vez abierta la ampolla, el contenido se debe utilizar inmediatamente. Cualquier producto no utilizado debe ser desechado. No use Quinsair si nota que está turbio o hay partículas en la disolución.

