



HORARIO RECOGIDA

MAÑANAS (Lunes a Viernes)	8.30 a 14.30 horas
TARDES (Lunes a Jueves)	16.00 a 19.30 horas



TELÉFONOS

CONSULTAS EXTERNAS → 954 782335

LABORATORIO → 954 782302

Hospital Universitario Virgen Macarena

PACIENTES EXTERNOS 1
Farmacia
HUV Macarena y Área



Composición por 50 g

Timolol maleato	0,34 g
Carbopol 940	1,25 g
Propilenglicol 30%	15 g
Agua conservans csp	50 g
Trietanolamina	cs

TIMOLOL
GEL 0,5%



CONSEJERÍA DE SALUD

TIMOLOL GEL 0,5%

1º ¿PARA QUÉ SE UTILIZA?

El **timolol** es un fármaco betabloqueante, que en este caso se utiliza para tratar unos pequeños tumores benignos que pueden aparecer en los niños llamados hemangiomas.

2º POSOLOGÍA

Generalmente la pauta es de dos veces al día, aunque será su médico quien la indique la pauta exacta.

La duración del tratamiento suele ser 3 a 4 meses, aunque igualmente su médico le indicará el tiempo exacto.

3º ¿CÓMO DEBO APLICARLO?

-Lávese las manos antes y después de la aplicación.

-Aplíquelo sobre la lesión extendiendo una fina capa y protegiendo muy bien la piel de alrededor. Tenga especial cuidado en el caso de los ojos.

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

4º ALGUNOS EFECTOS ADVERSOS SON...

Generalmente no se absorbe para alcanzar concentraciones en sangre que puedan provocar efectos adversos. No obstante ha habido algún caso de aparición de:

Ritmo cardiaco lento o irregular
Presión sanguínea baja;
Dificultad al respirar con silbidos o tos...
Niveles bajos de azúcar.

Póngase en contacto si viera que aparecen alguno de estos síntomas.

6º CONTRAINDICACIONES.

No utilice este medicamento en caso de alergia al principio activo (timolol) o a alguno de sus excipientes.

Se utiliza en niños a partir del primer mes. No se recomienda el uso en caso de prematuros ni neonatos.

6º PRECAUCIONES

Precaución en pacientes con enfermedades cardiacas o respiratorias que sean más sensibles al broncoespasmo, como asma.

Debería usarse con precaución en embarazo y lactancia.

En caso de contacto con los ojos aclarar con abundante agua, manteniendo abiertos los párpados. Si persistiera el dolor a pesar del lavado póngase en contacto con su médico o acuda a Urgencias.

5º INTERACCIONA CON...

Debido a su escasa absorción a sangre no se han descrito interacciones con otros fármacos; no obstante otros medicamentos que tengan los mismos efectos podrían ver incrementada su actividad.

8º CONSERVACIÓN

Mantener el envase en un lugar seco y protegido de la luz.

Mantener el envase a una temperatura inferior a 25°C.



9º CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad que indica en la etiqueta. Son 60 días después de la fecha de fabricación.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque tengan síntomas similares.