SABÍA QUE…

Clorambucilo (Leukeran) pertenece a un grupo de fármacos llamados agentes alquilantes, que interfieren en la replicación de las células cancerosas, deteniendo o retradando su crecimiento. Está indicado para tratar enfermedades como leucemia linfocítica crónica, linfomas malignos, linfomas de Hodgkin, cáncer de ovario, etcétera.

¿Cómo debe tomarlo?

La dosis y la duración del tratamiento puede variar dependiendo de varios factores. Aténgase estrictamente a la pauta que le haya prescrito su médico.
Tome los comprimidos con un buen vaso de agua. Preferiblemente con el estómago vacío, y es importante tomarlo todos los días a la misma hora y de la misma forma.
NO MASTIQUE ni chupe ni rompa el comprimido.
Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
Beba bastante agua durante el tratamiento (a menos que le indiquen lo contrario), evite comidas muy condimentadas o muy calientes y no abuse de bebidas alcohólicas

La dosis diaria que le han prescrito a usted es de

Clorambucilo ___14 mg, o sea ___ **7** comprimidos

Debe tomarlos todos los días a la misma hora y en las mismas condiciones, durante el tiempo que le haya indicado su médico.

¿QUÉ HACER SI OLVIDA TOMAR SU DOSIS?

Si ha olvidado tomar su dosis, tómela lo antes posible si aún no han pasado 12h; si se ha acordado 12 horas más tarde, no lo tome y espere a la siguiente dosis. **NUNCA TOME UNA DOSIS DOBLE para compensar olvidos.**
Si vomita repita la dosis sólo si ha pasado media hora o menos desde la toma. Si vomitó después de ese tiempo no repita la dosis.

No tome Leukeran si…

1) **ESTÁ EMBARAZADA:** Debe usar un método anticonceptivo seguro mientras usted **o su pareja** esté en tratamiento. El clorambucilo causa daños irreparables en el feto.
2) Si está en período de lactancia.
3) Si es alérgico al clorambucilo o a otros agentes alquilantes.

PRECAUCIONES:

1) En pacientes con antecedentes de convulsiones, enfermedad hepática o cardíaca.
2) Precaución también en pacientes con reducción quirúrgica de intestino o estómago.
3) Este medicamento contiene lactosa.
4) Comunique a su médico o farmacéutico en caso de vacunación (evitar vacunas "vivas").
5) Si toma el sol use protección solar adecuada

Reacciones adversas

Se tolera bastante bien, pero las más frecuentes que pueden aparecer son:
Mayor susceptibilidad a sufrir infecciones: aumente las medidas higiénicas, lávese con frecuencia las manos y evite aglomeraciones y personas con procesos infecciosos.
Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga precaución con golpes y objetos cortantes.
Náuseas, vómitos o molestias intestinales.
Pueden aparecer llagas en la boca o garganta. Siga las medidas que le hayan indicado.

ACUDA AL MÉDICO SI:
TIENE FIEBRE POR ENCIMA DE 38ºC, sangre en orina, heces negras o hematomas importantes. Avise si se nota la piel o los ojos amarillentos o la orina parduzca. Si tiene convulsiones, alucinaciones o confusión. También si aparece una reacción en la piel grave o dificultad para respirar, o si se nota los pies y los tobillos muy hinchados.

Interacciones del clorambucilo con otros medicamentos:

Existen riesgos si toma conjuntamente clorambucilo con otros medicamentos como:
- Medicamentos que puedan afectar también la función inmune.
- Medicamentos que puedan provocar también hemorragias
- Medicamentos que sean tóxicos para el hígado.
- No está muy claro pero en algunas fuentes citan interacciones con antiácidos como el Almax, Alka-Selzer, Rennie, etcétera. Como medida de precaución, es conveniente tomar los antiácidos separados en el tiempo al menos 2 horas si es posible.

Es importante que consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un nuevo medicamento, complejo vitamínico o planta medicinal.